

ZWARTENHOEK

1979



W. van laere
baljuwstraat 16
4551 tg
Sas van gent
tel: 01158-2760

FAUNA + FLORARAPPORT
Kreek en weiden gebied
ZWARTENHOEK

te

Axel

met medewerking van
Vogelwacht oostzeuws-
vlaanderen **DE STELTKLUUT.**

Torenvalk. (Falco tinnunculus)

Fauna en flora rapport van het kreek
en weidengebied ZWARTENHOEK. lopende
I Januari 1979 tot 3I December 1979
en waarin te vinden zijn:

Inleiding	P. 1
Behoud, beheer, gebeurtenissen	P. 2
Jacht	P. 3
Fauna en flora.	P. 4
Besluit	P. 5

I. INLEIDING

Het afgelopen jaar mag, ondanks de strenge winter van 1978/1979 en een paar andere minpunten, zeer goed genoemd worden.

Er is namelijk een voorzichtige mentaliteits verandering aan het groeien ten gunste van Zwartenhoek, en wel op de volgende punten: Met toestemming van het Waterschap Axeler Ambacht werden 45 knotwilgen geplant beneden de dijk van de rijksweg om een bufferzone te krijgen tussen kreek en rijksweg.

Voor een behoorlijke winter-waterstand op de wei wordt een stuw geplaatst.

De jagers zullen voor hun doen en laten meer rekenschap moeten afleggen aan het Waterschap.

De familie van Acker verleende toestemming tot het plaatsen van een observatiehut, en het maken van broedgelegenheid voor de oeverzwaluw.

Aan al deze mensen die voor deze totstandkoming hebben gezorgd mijn welgemeende dank.

Het afgelopen jaar bracht ook minpunten met zich mee.

De observatiehut werd een week na het plaatsen voor een groot gedeelte vernield, dader(s) onbekend.

Aan de slakkenfarm is een vuilstort verzezen met rotte aardappele huisvuil kunstmestzakken en andere rommel

De Bruine Kiekendief, 2 paar Blauwborsten, en een paartje Snor zijn vestoord op hun nesten door het maaien van snippenbedden ten behoeve van de jacht

Het verbod tot het vellen, rooien, of beschadigen van aanwezige vegetatie zonder aanlegvergunning, van het bestemmingsplan buiten gebied van de gemeente Axel bij Kon. Besluit van 12 maart 1977 no. 54 is vernietigd en tot op heden niet is aangepast.

Het wordt tijd dat men de natuurwaarde van Zwartenhoek eens op zijn waarde zal schatten, en het die bescherming toekennen, dat het zich kan herstellen van de aanslagen die zich in het verleden en heden ten dage hebben voorgedaan.

Het zal ten goede komen van Zwartenhoek.

2. Behoud beheer gebeurtenissen.

Waterbeheersing Waterkwaliteit.

Op de kreek werd geen of weinig algenbloei vastgesteld.

Het waterpeil op de kreek kwam nooit lager dan NAP-100, maar begin Oktober was de waterpeilmeter ruim 30 cm onder water verdwenen.

Op het weiland stond \pm 40 cm water.

Het hoge waterpeil op de kreek en de wei werden veroorzaakt door werkzaamheden aan de rijkswaterleiding.

Tussen April en oktober was de wei tamelijk droog.

Kreekstrand en rietveld.

Het kreekstrand zinkt niet verder in de kreek weg

Een veenachtige laag is nu zichtbaar geworden, en in de zomer zelfs begaanbaar.

De wilgen die omvergevallen zijn zullen terug door nieuwe aanplant worden vervangen.

De lisdodde heeft zich weinig uitgebreid.

Zowat alle weiden en taluds werden laat gemaaid, behalve de snippenbedden, deze werden reeds op 7 juli gemaaid,

Dit is veel te vroeg, mede door het slechte voorjaar waren hier nog vogels aan het broeden.

Verstoring en vervuiling.

Er werd dit jaar slechts een gaskanon gebruikt zonder noemenswaardige verstoring voor de vogels op de wei.

Kantbranden gebeurde enkel langs de rijkswaterleiding.

Tijdens het spuiten van aardappelen, langs de zuidzijde van de kreek is een gedeelte van het wilgeroosje verloren gegaan.

Het betrachten van voorzichtigheid is hier op zijn plaats.

De vlotjes op de kreek zijn voor het grootste gedeelte vernield door de strenge winter, nieuwe vlotjes liggen reeds klaar om op de kreek gelegd te worden.

De oude vlotjes zijn in de rietkragen terechtgekomen en er wordt door de diverse vogels dankbaar gebruik van gemaakt

Bij de diverse werkzaamheden die in het gebied uitgevoerd werden was dhr. J. v/d Kammen steeds van de partij, mijn hartelijke dank hiervoor.

Jacht

Vandaag aan de dag kan men zien dat de jacht ter discussie wordt gesteld, mijn inziens terecht.

Als ik zie hoe op Zwartenhoek wordt gejaagd, dan is beheersjacht en natuurlijk evenwicht, woorden waar de heren jagers rijkelijk met strooien, een aanfluiting voor het gebied."

Het heeft geen zin om elkaar via persmedia te beledigen, wat nogal eens gebeurt, zonder concrete feiten op te sommen.

Men moet n.l. alle feiten op een rijtje zetten, en uit deze gegevens kan men dan constateren of een gebied werkelijk wel zo weidelijk bejaagd wordt als de heren zeggen.

Op Zwartenhoek zijn de volgende feiten geconstateerd:

De jagers zijn qua menselijke benadering autoritair ingesteld, wat onderling overleg tussen mij als natuurbeschermer en zij als jager een goede verstandhouding in de weg staat.

De snippenbedden worden te vroeg gemaaid, (7 juli) terwijl op 18 aug de jacht op snippen pas open gaat.

Bruine kiekendief, Blauwborst, en Snor zijn hiervan het slachtoffer geworden, mede door het slechte voorjaar zaten deze dieren nog te broeden,

Een opmerkelijk feit was dat de jagers ontkenden dat de Bruine kiekendief verstoord was, maar de jachtopziener zei " de kiekendief is verstoord, maar dit geeft niet want er zijn er toch genoeg "

Een uitspraak die tot nadenken stemt.

Na ongeveer 3 weken stijgt het aanbod van ingewanden die door de Kiekendief achtergelaten worden.

Een duidelijk bewijs dat dieren aangeschoten worden en ondanks de jachthonden toch blijven liggen in het riet of greppel.

Zo vond ik op 19 aug. een wilde eend in de aanplant naast de hut met de vleugel aan flarden geschoten.

In het zuidelijk snippenbed tussen kleine lis een dode snip en een snip met de poten kapot geschoten, ik heb het dier uit zijn lijden verlost.

Bezuiden de slakkenfarm een wilde eend blind geschoten en in de prikkeldraad een marteldood gestorven.

Op 6 okt. stond ik op de Axelse dijk met een telescoop (60 x vergroting) het jacht gebeuren gade te slaan, en zag het volgende gebeuren, Op 3 overvliegende eenden werd 8 maal geschoten, de middelste eend werd dodelijk getroffen de andere 2 vlogen duidelijk aangeschoten verder.

Op 8 watersnippen werd er 7 maal geschoten, een dodelijk getroffen 2 snippen aangeschoten en 1 snip is met kapot geschoten vleugel in het bouwland terecht gekomen.

Er werd geen moeite gedaan de dieren op te sporen.

Op 15 dec. was het noodweer, zowat elke vogel zat verscholen voor dit verschrikkelijke weer, toch werd er gejaagd op dieren die vanwege dit weer geen enkele kans hadden.

En op deze dag kreeg ik toch een antipathie tegen deze heren, mede door een antwoord van dhr. Kervyn, nl. toen ik hem vroeg hoe het kwam dat er zo slecht geschoten werd antwoordde hij: "Dat weet ik we worden nl. vergezeld van een oudere man, hij ziet wel zo goed niet meer, maar hij wil ook zijn plezier hebben."

Een vriend die op dat moment in de hut zat verkeerde in alle staten, na dit antwoord.

Hier wordt het bewijs geleverd dat, of het dier pijn lijdt of niet het de heren niets kan schelen als ze maar plezier hebben.

Dhr. Tombeur heeft dit ook reeds gemeld, maar we worden door de jagers uitgemaakt voor leugenaars.

De verstoring in het gebied is totaal tijdens de jacht,
 Dit kan ook niet anders in een gebied van slechts 30 HA.
 In mijn bezit bevindt zich een plastic zak met \pm 600 patroon hulzen
 die dit jaar verschoten zijn op Zwartenhoek.
 Volgens de jagers kan dit niet, maar dan wil ik toch wel eens weten
 waar ze dan vandaan komen.

Uit deze vondst kan men n.l. het een en ander berekenen.
 Ik heb een jachtpatroon uit elkaar gehaald en de verschillende
 onderdelen gewogen en geteld.

Gewicht plastic huls	=1,8103 gram	
Gewicht koperen slaghoed	=7,1164 gram	Patroon nr (7)
Gewicht hagelkorrel	=30 gram	
Aantal hagelkorrels	=400 stuks	

Op Zwartenhoek wordt al 70 jaar gejaagd, en nu kan men gaan rekenen

70 jaar	x	600 patronen-----	=	42000 hulzen
42000	x	1,8103 gram plastic-----	=	76032.6 gram plastic
42000	x	7,1164 gram koper-----	=	298888.8 gram koper
42000	x	30 gram lood-----	=	1260000 gram lood
42000	x	400 st. hagelkorrels-----	=	16800000 st. hagelkor:

Uit deze berekening kan men zien dat er op het gebied totaal is
 weggegooid;

42000 hulzen

ruim 76 kg plastic en/of karton

ruim 298 kg koper

ruim 1260 kg lood (1, 26 ton)

ruim 56 hagelkorrels per m²

Over milieuvervuiling gesproken!

Een engels onderzoek heeft uitgewezen dat \pm 17 % van de eenden ster-
 aan opname door hagelkorrels die op het land liggen, wel dan komen
 ze op Zwartenhoek vast en zeker wel aan hun trekken.

Tot slot zou ik willen opmerken dat de belgische jagers beter een voorbeeld zouden nemen aan de mensen die op het zuidelijke deel van Zwartenhoek jagen, met name de heren van Acker.

Ik heb deze mensen geobserveerd tijdens het jagen zonder dat ze wisten dat ik er was, ik heb met ze gepraat, en ben tijdens de jacht eens meegegaan,

Conclusie, op elk moment bereid tot een afspraak, geen gezeur over het wel of niet verblijven tijdens de jacht op hun gebied, bij enige twijfel wordt er niet geschoten, en wanneer er b.v een fazanthen wordt geschoten, dan mag de betreffende schutter een boete betalen aan een soort jachtfonds.


dit houdt in dat men eerst kijkt voordat men schiet, en dit kan men met recht weidelijk jagen noemen.

Rest mij nog te vertellen dat uitspraken zoals van dhr de Regt dat de Bruine kiekendief 20 hazen had gepakt, er alleen toe bijdragen dat de kiekendief met argus ogen wordt bekeken door de belgische jagers, waardoor we het plaatsen van een roestpaal maar gelaten hebben bang zijnde dat het dier er op een kwade dag wordt afgeschoten. Het wordt een mode om onwaarheden te verspreiden n.l wanneer er 20 hazen gepakt zouden zijn; dan had er een grote populatie hazen in het gebied aan wezig moeten zijn, gezien het zeer grote aantal konijnen dat in deze streek verblijft zal het met die hazenpopulatie wel meevallen.

Volgens mij wordt het nodig, dat wij als natuurbeschermers, het Axeler Ambacht, en de jagers eens rond de tafel gaan zitten, waardoor ieder zijn visie over deze problematiek eens naar voren brengt om zodoende voor ieder een bevredigende oplossing te vinden.

Hopelijk wordt dit niet verstoord door een 70 jarige traditie.

Bruine kiekendief ♀
(*Circus aeruginosus*)



4. Fauna en flora

Vogels

Het afgelopen jaar had heel wat te bieden.

Er werden n.l. 121 soorten en ondersoorten waargenomen.

Bij de reeds 170 waargenomen soorten kwamen er 4 nieuwe bij, wat het totaal op 174 soorten brengt.

Nonnetje 3 vogels op de rijkswaterleiding. 25 Februari

Bonte vliegenvanger 1 vogel bij de hut. 19 Mei

Grauwe klauwier 3 vogels bij de slakkenfarm 2 Juni

Geoorde fuut 1 vogel op de kreek 16 December.

AVIFAUNA

Geoorde fuut Podicipediformes. Zeldzame vogel.

Eén waarneming op de kreek op 16 December.

Nieuwe vogel voor het gebied.

Fuut Podiceps cristatus. Zeldzame vogel.

Slechts één waarneming op de kreek op 17 maart.

Dodaars Podiceps ruficolles. Wintergast.

6 waarnemingen op de kreek, 3 vogels op 24 Maart, 1 vogel op 26 Maart
2 vogels op 7 April, 3 vogels op 14 April, 2 vogels op 21 April, en
een laatste waarneming van 2 vogels op 6 Mei.

Blauwe reiger Ardea cinera. Jaargast.

Regelmatig het hele jaar te zien, met een max. van 6 vogels op 11 Aug,
en 9 vogels op 10 Oktober.

Wilde eend Anas platyrhynchos. Jaarvogel.

Broedvogel: Minimaal 8 paar.

Regelmatig het hele jaar te zien, met een max. van 60 vogels in Sept.
100 vogels in Oktober, 150 vogels in november, en 50 vogels in Dec.

Wintertaling Anas crecca. Jaarvogel.

Broedvogel. Min één paar.

Regelmatig als doortrekker en wintergast, 30 in Februari, 200 in Maart
10 in April, koppulatie op de wei, slechts één Juni waarneming, 120
in December.

Zomertaling *Anas querquedula*. Zomervogel.

Broedvogel. Min een paar.

Sterke achteruitgang, het gehele jaar door niet meer dan 2 vogels uitgezonderd 4 vogels op II Augustus.

Krakeend. *Anas strepera*. Zeldzame vogel.

Slechts 2 waarnemingen 2vogels op I4 April en I2 vogels op I6 Dec.

Smient *Anas penelope*. Wintergast,

Duidelijk minder vogels dan voorgaande jaren, 300 vogels in Februari 60 vogels in Maart, I vogel op 2I April.

Pijlstaart *Anas acuta*. Wintergast.

Onregel matige doortrekker. 50 vogels op 24 Maart, 25 vogels op 7 Apr.

Slobeend *Anas clypeata*. Jaarvogel.

Broedvogel. Min een paar.

Regelmatig heel het jaar te zien. IO vogels op 25 Feb, I5 vogels op I5 Maart, 6 vogels op I4 April.

Lage aantallen zijn te wijten aan de strenge vorst van afgelopen winter.

Kuifeend *Aythya fuligula*. Wintergast.

Broedvogel, Min een paar.

Max. 6 vogels in April, 6, vogels in Mei, 3 vogels op I5 Augustus.

Tafeleend *Aythya ferina*. Jaarvogel.

Broedvogel. Min 2 paar.

Regelmatig te zien. aantallen duidelijk minder. 8 vogels in Maart, IO vogels in April, 6 vogels in Mei/Juni, de rest van het jaar niet meer dan 4 vogels.

Grote zaagbek *Mergus merganser*, Wintergast.

Slechts één waarneming van 2 vogels in zit op de wei

Bergeend *Tadorna tadorna*. Jaarvogel.

Broedvogel. een paar.

Regelmatig te zien. 6 vogels in Feb/Maart, I4 vogels in April, I4 vogels in Mei, I2 vogels en een koppel met I2 jongen. op 9 Juni Een Augustus waarneming van IO vogels waarvan I vogel met ring.

Grauwe gans *Anser anser*, Wintergast.

Slechts een waarneming van 2 vogels in zit op 7 April voor de hut.

Kolgans Anser albifrons. Wintergast.

Regelmatige doortrekker, 1600 vogels in Januari, 300 vogels in Feb, 300 vogels in Maart, op de wei of bouwland.

Rietgans Anser fabalis. Wintergast.

4 waarnemingen met een max. van 120 vogels in Jan/Feb, en een waarneming van 3 vogels op 1 Maart.

Brandgans Branta leucopsis. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming op 25 Februari van een vogel in zit op de wei.

Knobbelzwaan Cygnus olor. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen van telkens een vogel in zit en wel op 21 April, en een op 15 december.

Buizerd Buteo buteo, Zeldzame vogel.

4 waarnemingen, 1 schroevende vogel boven de wei op 26 Maart, en 3 vogels in de bomen zittend van het dreefje, op 28 Mei, 27 Juni, 7 Juli.

Bruine kiekendief Circus aeruginosus. zeldzame vogel.

Broedvogel een paar en een broedpoging.

De Bruine kiekendief heeft het wel zeer goed gedaan dit jaar.

24 Maart 2 vrouwtjes, 21 April 2 vrouwtjes 1 mannetje, 6 Mei 2 vrouwtjes 2 mannetjes, 19 mei 2vrouwtjes 1 mannetje tweede mannetje verdwenen en niet meer terug gezien.

2 Juni een vrouwtje broedt een vrouwtje broedpoging. (bigamie?)

9 Juni 3 vrouwtjes 2 mannetjes, 5 Juli 4 vrouwtjes 1 mannetje,

8 Juli 2 vrouwtjes 1 mannetje en 3 jonge vogels, 15 Augustus 3 jonge vogels, 3 September 3 vrouwtjes 1 mannetje 3 jonge vogels laatste waarneming,

Het was een fantastisch gezicht deze vogels over de kreek te zien buitelen.

Blauwe kiekendief Circus cyaneus, Wintergast.

Vaste verschijning, nooit meer dan 3 vogels, laatste waarneming 31 Maart.

Rode wouw Milvus milvus. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen een vogel overvliegend op 19 Mei zuid westelijke richting, (G. van Avermaet) en een vogel overvliegend noord oostelijke richting op 28 juli (J.P. Kervyn)

Sperwer Accipiter nisus. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen, een vogel op 14 April en een vogel op 3 Oktober.

Boomvalk Falco subbuteo. Zeldzame vogel.

Een waarneming van 2 vogels op 6 Mei.

Torenvalk. Falco tinnunculus. Jaargast.

Geen broedvogel dit jaar, vrij regelmatig te zien, nooit meer dan 2 vogels

Steenuil Athene noctua. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming. op 2 juni , blijft potentiële broedvogel.

Velduil Asio flammeus. Zeldzame vogel.

Een waarneming op 24 Maart in het riet. (J. v/d Kammen)

Ransuil Asio otus. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen van een vogel in de buurt van 2 oude eksternesten op de aanplant van, van Acker. en wel op 19 Mei, en op 5 Juli.

Patrijs Perdix perdix. Jaarvogel.

Broedvogel. min 4 paar.

Heel het jaar regelmatig te zien. met een max. van 25 vogels.

Fazant Phasianus colchicus. Jaarvogel.

Broedvogel. Min 3 paar.

Regelmatig heel het jaar door. tot max. 10 vogels in Feb, 16 vogels in Maart, 24 vogels in April.

Waterhoen. Gallinula chloropus. Jaarvogel.

Broedvogel. min 5 paar.

het gehele jaar door te zien, tot max. 20 vogels.

Meerkoet. Fulica atra. Jaarvogel.

Broedvogel. min 6 paar.

Identiek beeld als voor de waterhoen, tot max 120 vogels
Soms massaal aanwezig op de wei.

Scholekster. Haematopus ostralegus. Zomervogel.

Broedvogel. min een paar.

In aantal verminderd, met max. van 6 vogels in Feb/Maart/April.

Coppulatie op 28 April. 10 vogels in Aug,

Kievit *Vanellus vanellus*. Jaarvogel.

Broedvogel, min, 20 paar.

Heel het jaar door te zien. 600 vogels in december. tamelijk vaste aantallen dit jaar, min 100 vogels waren steeds aanwezig.

Zilverplevier *Pluvialis squatarola*. Zeldzame vogel.

Een waarneming van 2 vogels op de wei, op 19 Mei.

Goudplevier *Pluvialis apricaria altifrons*. Doortrekker.

50 vogels op 18 maart. 30 vogels op 7 April, 10 vogels op 4 Augustus, op 15 Augustus 1 vogel in zomerkleed, 15 December 100 vogels.

Bontbekplevier. *Charadrius hiaticula*. Doortrekker.

4 waarnemingen, 2 vogels op 17 Maart, 2 vogels op 24 Maart, 2 vogels op 7 April, en een vogel op 28 April.

Kleine plevier. *Charadrius dubius*. Zomervogel.

Snelle achteruitgang, mede door het ontbreken van slikstrandjes.

Slechts één waarneming op 28 April.

Strandplevier *Charadrius alexandrinus*, Zomervogel.

Identiek beeld, een waarneming van 2 vogels op 19 Mei.

Watersnip *Gallinago gallinago*. Jaarvogel.

Minder aantallen dan voorgaande jaren. tot max 4 vogels in Maart/Apr. ontbrekend in Juni/Juli, daarna regelmatig. 12 vogels op 11 Augustus 18 vogels op 3 Oktober., en op 15 december 4 vogels op de wei.

Bokje *Lymnocyptes minimus*. Wintergast.

Een waarneming, een vogel op de wei op 3 Oktober.

Wulp *Numenius arquata*. Jaargast.

Sterk wisselende aantallen. 10 vogels in Februari, 80 vogels in Maart een waarneming in April, 2 waarnemingen van 2 vogels in Mei, ontbrekend in Juni, 15 vogels in Juli, 50 vogels in Augustus, 70 vogels in Nov/dec.

Regenwulp *Numenius phaeopus*. Zeldzame vogel.

Een waarneming tijdens zitexcursie van 2 vogels in zit op de wei op 15 Augustus.

Turkse tortel. *Streptopelia decaocto*. Zeldzame vogel.
Wordt iets talrijker, 12 waarnemingen van max. 4 vogels.

Koekoek. *Cuculus canorus*. Zomervogel.

Broedvogel Min, 4 paar.

Regelmatige verschijning. van 29 April tot 4 September.

Op 2 juni zat een max. van 12 vogels in de wilgeboom zuidelijk van de kreek.

Gierzwaluw . *Apus apus*. Zomergast.

Vrij regelmatig te zien. met als uiterste data: 19 mei tot 15 Augustus.
met max. van 20 vogels.

Grote bonte specht. *Dendrocopos major*. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming. één vogel op dode boom kreekstrand, op 24 Maart

Veldleeuwerik. *Alauda arvensis*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 6 paar.

Regelmatig heel het jaar door. eerste zang op 3 Maart.

Boeren zwaluw *Hirundo rustica*. Zomervogel.

Regelmatige zomergast met als uiterste data: 14 April. en 22 Augustus.
tot max 120 vogels in Augustus.

Huiszwaluw *Delichon urbica*. Zomervogel.

Regelmatige zomergast met als uiterste data: 14 April en 12 Oktober.

Aantallen iets minder dan voorgaande jaren, tot een max van 30 vogels,

Oeverzwaluw *Riparia riparia*. Zomergast.

Verschijnt regelmatig. passende broedgelegenheid ontbreekt.

Met toestemming van de eigenaar zal hier verandering in worden gebracht.

Een max. van 6 vogels werd gezien op 4 September.

Boom pieper *Anthus trivialis* Zeldzame vogel.

4 waarnemingen op volgende data: 19 Mei een vogel, 2 Juni 2 vogels,
9 Juni 2 vogels, en een laatste waarneming op 8 Juli, alle in de aan
plant langs de rijksweg.

Graspieper. *Anthus pratensis*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 4 paar.

Heel het jaar door te zien, soms wisselende aantallen.

Grutto. *Limosa limosa*, Zomervogel.

Broedvogel, min 10 paar.

Heeft het zeer goed gedaan dit jaar, regelmatig te zien met max, aantallen van 70 vogels in Maart, 40 vogels in April, 30 vogels en jongen in Juni, 24 vogels in Juli, laatste waarneming 4 vogels op 15 Augustus.

Witgatje. *Tringa ochropus*. Doortrekker.

2 voorjaarswaarnemingen, 1 vogel op 14 April, en 2 vogels op 29 April, 2 Juli waarnemingen van telkens een vogel.

Bosruiter. *Tringa glareola*. Doortrekker.

Slechts 2 waarnemingen van 2 vogels op 11 Augustus, en een vogel op 3 Oktober.

Oeverloper, *Tringa hypoleucos*. Doortrekker.

Onregelmatig te zien, een Mei waarneming op 6 Mei van 2 vogels, verdere data 2 vogels op 4 Augustus, 8 vogels op 15 Augustus, en op 3 Oktober een max. van 22 vogels op de wei.

Tureluur. *Tringa totanus*. Zomervogel.

Broedvogel. min 5 paar.

Wordt talrijker, regelmatig gezien op volgende data: 8 vogels in Maart, 7 April 12 vogels, 28 April copulatie, 6 Mei 12 vogels, 27 mei 14 vogel 9 juni 10 vogels met jongen, 7 juli 18 vogels, een jonge vogel verongelukt in de prikkeldraad, laatste waarneming van 2 vogels op 4 Augustus

Zwarte ruiter. *Tringa erythropus*. Doortrekker.

4 waarnemingen op volgende data van telkens één vogel: 14 April, 28 April 19 Mei, en een laatste waarneming op 27 Mei.

Groenpootruiter *Tringa nebularia*. Doortrekker.

7 waarnemingen, en wel op volgende data: een vogel op 29 April, 2 vogels op 27 Mei, een vogel op 5 Juli, en 7 juli, een vogel op 4 Augustus, en een laatste waarneming op 15 Augustus.

Kemphaan *Philomachus pugnax*. Zomervogel.

Regelmatig tussen Maart en Augustus. met max 6 vogels in Maart, 20 in April, 35 vogels in Mei, ontbrak in Juni, een vogel in Juli, laatste waarneming van 20 vogels op 4 Augustus, geen broedvogel dit jaar.

Kluut *Recurvirostra avosetta*. Zomervogel.

Broedvogel. min 3 paar, 2 paar op de wei, en een paar op het hoger gelegen bouwland.

Regelmatige zomervogel, met als uiterste data: 3 Maart tot 4 Augustus. 2 vogels op 3 Maart, 6 vogels op 31 Maart, 12 vogels op 29 April, tevens koppulatie op de wei, 4 Augustus laatste waarneming van 4 vogels.

Kleine mantelmeeuw *Larus fuscus intermedius*. (Scandinavische vorm)
Slechts een waarneming van een adulte vogel op 16 December.

Zilvermeeuw. *Larus argentatus*. Jaargast.

Vrij regelmatig te zien. van Feb., tot December, met een max van 20 vogels

Stormmeeuw *Larus canus*. Wintergast,
Regelmatig als doortrekker te zien. tot max. 12 vogels.

Kokmeeuw *Larus ridibundus*. Jaargast.

Identiek beeld, regelmatige verschijning, tot max, 110 vogels in September.

Zwarte stern. *Chlidonias niger*. Zeldzame vogel.

Een waarneming van een vogel boven de kreek op 27 Mei.

Visdief. *Sterna hirundo*. Zomervogel.

Broedvogel, Eén paar op een vlotje gelegd op de kreek.

Verscheen 6 mei op de kreek, zat op 9 juni tebroeden, en had een jong op 11 Augustus, Laatste waarneming op 22 Augustus.

Holenduif. *Columba oenas*. Zomervogel.

Broedvogel, Heeft gebroed in torenvalkkast bij de slakkenfarm.

Vanaf 31 maart tot 16 Augustus gezien, met op 16 Augustus 8 vogels tevens laatste waarneming.

Houtduif. *Columba palumbus*. Jaarvogel.

Broedvogel, min 4 paar.

Minder talrijk dit jaar, met een max. van 100 vogels.

Tortelduif, *Streptopelia turtur*. Zomervogel.

Broedvogel. Een paar,

Niet meer zo talrijk als vroeger, met maar een max van 8 vogels in 11 Aug door het jaar heen niet meer dan 4 vogels.

Cur

Witte kwikstaart. *Motacilla alba alba*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 3 paar.

Is regelmatig te zien met max. van 20 vogels.

Gele kwikstaart, *Motacilla flava flava*. Zomervogel.

Broedvogel. min 3 paar.

Regelmatische verschijning. met een max. van 16 vogels.

Winterkoning. *Troglodytes troglodytes*: Wintergast.

Regelmatische verschijning. tot 6 vogels op 29 April, en 8 vogels op 11 Aug

Heggenus *Prunella modularis*. Jaarvogel.

Broedvogel. min, 1 paar

Af en toe onregelmatig, waargenomen max, 4 vogels bij de slakken farm.

Grauwe klauwier. *Lanius collurio*. Zeldzame vogel.

Een waarneming van 2 mannetjes en een vrouwtje in het oostelijk rietveld.
op 2 juni. Nieuwe vogel voor het gebied!

Grote lijster *Turdus viscivorus*. Wintergast.

Broedvogel. 1 paar

6 waarnemingen met een max. van 4 vogels.

Heeft gebroed in de buurt van de slakkenfarm.

Kramsvogel . *Turdus pilaris*. Wintergast.

Weinig bijzonderheden voor deze regelmatige doortrekker

Koperwiek. *Turdus iliacus*. Wintergast.

Identiek beeld als voor de kramsvogel.

Zanglijster . *Turdus philomelos*, Jaarvogel.

Broedvogel. min 3 paar.

Regelmatig heel het jaar door te zien. met een max van 10 vogels in
Oktober.

Merel. *Turda merula*, Jaarvogel.

Broedvogel. min 4 paar.

Heel het jaar door te zien. tot max 16 vogels in Maart.

Tapuit, *Oenanthe oenanthe*. Zeldzame vogel,

Slechts een waarneming van een vogel in het riet op 19 Mei.

Paapje. Saxicōla rubetra. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming van een mannetje op 4 Augustus.

Blauwborst. Cyanosylvia svecica cyanecula. Zomervogel.

Broedvogel. 3 paar!! laatst in 1969.

Een broedsel op het kreekstrand. een broedsel zuidoost van de kreek, en een broedsel noord oost van de kreek.

Een onverteerbare zaak was dat laatste 2 nesten (gelukkig al met vliegende jongen) verstoord werden op 7 juli tijdens het maaien van snippenbedden ten behoeve(plezier) van de jacht.

Laatste waarneming van 2 vogels op 26 Augustus.

Roodborst. Erithacus rubecula. Wintergast.

Regelmatige verschijning. tussen 18 September en 2 April, nooit meer dan 4 vogels.

Cettis zanger . Cettia cetti. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen van telkens 1 vogel met zang, op volgende data:

8 Juli, en een laatste waarneming op 4 Augustus.

Snor. Locustella luscinioides. Zomervogel.

Broedgeval, een paar,

Uiterste data: 14 April, en 4 Augustus. tot max 4 vogels.

Grote karekiet, Acrocephalus arundinaceus. Zomervogel.

Slechts een waarneming van een zingende vogel op 5 juli.

Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus. Zomervogel.

Broedvogel. min 9 paar.

Regelmatige zomervogel met als uiterste data: 29 April en 22 Augustus met een max. van 18 vogels.

Bosrietzanger , Acrocephalus palustris. Zomervogel.

Broedvogel. min. 5 paar.

Regelmatige verschijning met als uiterste dat: 6 Mei en 15 Augustus. met een max. van 14 vogels.

Rietzanger . Acrocephalis schoenobaenus. Zomervogel.

Broedvogel. min 8 paar.

Regelmatige zomervogel. met als uiterste data: 8 April, en 11 Augustus met een max van 20 vogels.

Tuin fluiter. *Sylvia borin*. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming van een zingende vogel bij de slakkenfarm op 14 April.

Grasmus, *Sylvia communis*. Zomervogel-
Broedvogel. I paar.

Onregelmatig gezien, behalve in de maanden Mei/Juni/Juli, nooit meer dan 4 vogels.

Fitis. *Phylloscopus trochilus*. Zeldzame vogel.

6 waarnemingen van 2 vogels op 7 April, 2 vogels op 14 April, 1 vogel op 21 April, 2 vogels op 6 mei, 2 vogels op 19 Mei, en 2 vogels op 4 Augustus.

Tjiftjaf. *Phylloscopus collybita*. Zeldzame vogel.

9 waarnemingen van 12 vogels op 31 Maart, 3 vogels 7 April, 3 vogels 14 April, 1 vogel 28 April, 1 vogel 6 Mei, 1 vogel 19 Mei, 2 vogels 27 Mei, 2 vogels 2 Juni, en 3 vogels op 18 Augustus.

Braamsluiper. *Sylvia curruca*. Zeldzame vogel.

Slechts een waarneming van een zingende vogel achter de hut (G. van Avermaet)

Goudhaantje . *Regulus regulus*. Zeldzame vogel.

Een waarneming van een vogel in de naburige aanplant, (G. van Avermaet)

Koolmees . *Parus major*. Jaarvogel.

Broedvogel. een paar. in nestkastje 4 jongen.

heel het jaar door te zien. met een max. van 10 vogels.

Pimpelmees. *Parus caeruleus*. Jaarvogel.

Broedvogel. een paar in nestkastje op het kreekstrand met 11 jongen

Heel het jaar door te zien met een max. van 12 vogels.

Matkop . *Parus montanus*. Zeldzame vogel.

3 waarnemingen op volgende data: 1 vogel op 31 Maart, 1 vogel op 7 April
2 vogels op 14 April.

Baardmannetje. *Panurus biarmicus*. Jaarvogel.

Broedvogel. min een paar.

Lage aantallen dit jaar mede door de strenge winter. met max van 12 vogels.

Bonte vliegenvanger. *Ficedula hypoleuca*. Zeldzame vogel.

2 waarnemingen van respectiefflijk I vogel op 19 Mei, en 2 vogels op 27 Mei. Is nieuwe vogel voor het gebied.

Grauwe gors. *Emberiza claudra*. Zomervogel.

3 waarnemingen van een vogel op 14 Mei, een vogel op 5 juli, en een vogel op 4 Augustus.

Geelgors, *Emberiza citrinella*. Zomervogel.

Slechts I waarneming van een zingende vogel op het kreekstrand op 2 juni.

Rietgors. *Emberiza schoeniclus*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 10 paar

Regelmatig heel het jaar door. tot een max. van 40 vogels.

Groenling. *Carduelis chlorus*. Jaarvogel.

Broedvogel. min I paar.

Aantallen duidelijk lager dan voorgaande jaren. nooit meer dan 8 vogel

Putter, *Carduelus carduelus*. Zeldzame vogel.

Slechts 2 waarnemingen van 2 vogels op 4 Augustus, en 4 vogels op 3 September,

Kneu. *Carduelus cannabina*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 4 paar.

Identiek beeld als voor de groenling, aantallen duidelijk lager. met een max, van 30 vogels.

Vink. *Fringilla coelebs*. Jaarvogel.

Broedvogel. een paar.

Heel het jaar door te zien, soms in grote getale over de kreek vliegend, op het gebied nooit meer dan 25 vogels.

Keep. *Fringilla montifringilla*. Wintergast.

4 waarnemingen op volgende data: 6 vogels op 17 Maart, 4 vogels op 24 Maart, I vogel op 7 April, en 2 vogels op 6 Mei.

Huisbus. *Passer domesticus*, Jaarvogel.

Broedvogel, min 6 paar.

Heel het jaar door te zien, dikwijls in gezelschap van de ringmus.

Ringmus. *Passer montanus*. Jaarvogel.

Broedvogel. min 5 paar.

Regelmatig te zien tussen Maart en November. met max, van 50 vogels.

Spreeuw, *Sturnus vulgaris*, Jaarvogel.

Broedvogel. min 3 paar.

Regelmatig heel het jaar door te zien, Met het rooien van een rij canada bomen is de slaappleats van de vogels verkleind.

Zwarte kraai . *Corvus corone corone*. Jaarvogel.

Is het hele jaar door te zien. met een max. van 30 vogels in Dec.

Bonte kraai. *Corvus corone cornix*. Wintergast.

Regelmatige doortrekker. nooit meer dan 10 vogels.

Roek. *Corvus frugilegus*. Wintergast.

Lage aantallen dit jaar, 5 vogels Nov/Dec. 2 vogels Februari.

Kauw . *Corvus monedula*, Wintergast.

Regelmatige wintergast, met een max van 40 vogels in december.

Ekster. *Pica pica*. Jaarvogel.

Aantal toegenomen. 2 schijn nesten op de aanplant van van Acker.

Regelmatig heel het jaar door te zien met max. van 10 vogels.

Casarca. *Casarca ferruginea*. Zeldzame vogel.

Een waarneming van een mannetje op de wei. het viel niet vast te stellen of dit een ontsnapt exemplaar was . opgemerkt dient te worden dat het verenkleed in uitmuntende staat verkeerde.



(Kluut. *Recurvirostra avosetta*)

5. Besluit

Zwartenhoek heeft ondanks de lagere aantallen vogels van de div. soorten vogels nog heel wat te bieden.

121 soorten en ondersoorten, 47 broedgevallen, zijn mooie cijfers voor het gebied., waarbij we niet mogen vergeten dat de afgelopen winter danig heeft huisgehouden onder sommige vogels, neem daarbij nog het slechte voorjaar. en de zaak is rond.

Als ik dan naar de aantallen kijk, van dit jaar, dan vind ik dat we niet mogen mopperen.

Hopelijk biedt 1980 betere weersomstandigheden.


Flora:

De flora kreeg dit jaar bijna geen aandacht.

Alleen is een waardevolle plek van de Zwanebloem door werkzaamheden aan de rijkswaterleiding totaal verdwenen.

Beheer

Rest mij nog de vraag, wanneer ZWARTENHOEK eindelijk eens gaat beheerd worden in overeenstemming met de officiële bescherming van het gebied, Zwartenhoek is het zeker waard.



Pijlstaart, (Anas acuta)

Sas van Gent 9-2-1980

W. van Laere

Baljuwstraat 16

4551 TG

Sas van Gent

Tel: 01158-2760